

# 腋臭症手術 年次レポート

Axillary Osmidrosis Surgery - Annual Statistical Report

## 01 - OVERVIEW

### レポート概要

当院で行った腋臭症手術の実績および術後成績をまとめた年次報告です。患者数、合併症率などを公開することで、医療の透明性と安全性の向上を目的としています。

対象期間 2025年4月 ~ 2026年3月

発行日 2026年4月

## 02 - VOLUME

### 手術件数

患者数

997例


手術側数

1,994側

※ 当院では原則として両側同時手術を行っています。（片側手術4例含む）

## 02B - MONTHLY VOLUME

### 月次手術件数



※ 単位：患者数（例） 片側手術は1例として計上

## 03 - DEMOGRAPHICS

### 患者背景

平均年齢 約25歳

男女比

Female 72~78% / Male 22~28%

■ 女性 約72~78% ■ 男性 約22~28%

## 04 - SURGICAL DATA

### 手術データ

平均手術時間 25~35分（両側）

※ 皮膚切開から縫合終了までの平均時間

## 術後通院

当院の腋臭症手術では

術後通院

1回（翌日）

- ※ 男性で広範囲の場合、血腫予防のため翌々日の場合があります。
- ※ 吸収糸を使用するため抜糸不要

## 術後合併症

術後血腫

約4~5%

定義：再開創を要する血腫

- ※ 軽度の皮下出血や小血腫は含みません。

## 再発

再発率

統計集計中（次回レポートに記載予定）

- 定義：医師が再発と診断した腋臭症
- ※ 患者の自覚臭のみの場合は含みません。

## 再手術

再手術率

約2~3%

月に2~3例程度

## 考察

当院では年間約1,000例の腋臭症手術を行っています。両側同時手術を基本としており、平均手術時間は約30分です。

腋臭症手術は経験が重要な手術であり、症例数の蓄積が術後成績の安定につながると考えています。

## 今後の課題

- 術後血腫のさらなる低減
- 術後満足度の定量評価
- 長期再発率の追跡

## まとめ

2025年4月~2026年3月の腋臭症手術実績

項目	結果
患者数	997 例
手術側数	1,994 側
平均手術時間	25~35 分
血腫率	約 4~5 %

再手術率

約2~3%

免責事項 / DISCLAIMER

本レポートは当院における統計情報の公開を目的として作成されたものであり、個別の診療結果・治療効果を保証するものではありません。掲載されている数値はすべて当院での実績に基づく統計値です。治療に関するご判断は、必ず医師との診察・相談のうえで行ってください。

ドクターミナガワ渋谷整形

院長 皆川 浩

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-15 カーサ渋谷2F / 03-3462-2266 / <https://2266.co.jp/>

© 2026 ドクターミナガワ渋谷整形 All Rights Reserved. 無断転載・複製を禁じます