

腋臭症手術 年次レポート

Axillary Osmidrosis Surgery — Annual Statistical Report

01 — OVERVIEW

レポート概要

当院で行った腋臭症手術の実績および術後成績をまとめた年次報告です。患者数、合併症率などを公開することで、医療の透明性と安全性の向上を目的としています。

対象期間

2025年6月 ～ 2026年5月

発行日

2026年6月

02 — VOLUME

手術件数

患者数

1,092例

手術側数


2,168側

※ 当院では原則として両側同時手術を行っています。

02B — MONTHLY VOLUME

月次手術件数

MONTHLY CASE COUNT — PATIENTS



※ 単位：患者数（例） 片側手術は1例として計上

03 — DEMOGRAPHICS

患者背景

平均年齢

約 25 歳

男女比

Female 73-80% / Male 20-27%

■ 女性 約 73～80%

■ 男性 約 20～27%

04 — SURGICAL DATA

手術データ

平均手術時間

25～35 分（両側）

※ 皮膚切開から縫合終了までの平均時間

05 — POST-OP VISIT

術後通院

当院の腋臭症手術では

術後通院

1回（翌日）

- ※ 男性で広範囲の場合、血腫予防のため翌々日の場合があります。
- ※ 吸収糸を使用するため抜糸不要

06 — COMPLICATIONS

術後合併症

術後血腫

1～3%

定義：再開創を要する血腫

※ 軽度の皮下出血や小血腫は含みません。

07 — RECURRENCE

再発

定義：医師が再発と診断した腋臭症
※ 患者の自覚臭のみの場合は含みません。

08 — RE-OPERATION

再手術

再手術率
約1 %
月に1例程度

09 — DISCUSSION

考察

当院では年間約1,000例以上の腋臭症手術を行っています。両側同時手術を基本としており、平均手術時間は25～35分です。

腋臭症手術は経験が重要な手術であり、症例数の蓄積が術後成績の安定につながると考えています。

10 — FUTURE CHALLENGES

今後の課題

→ 術後血腫のさらなる低減

→ 術後満足度の定量評価

→ 長期再発率の追跡

11 — SUMMARY

まとめ

2025年6月～2026年5月の腋臭症手術実績

項目	結果
患者数	1,092 例
手術側数	2,168 側
平均手術時間	25～35 分
	..

血腫率

約1〜3%

免責事項 / DISCLAIMER

本レポートは当院における統計情報の公開を目的として作成されたものであり、個別の診療結果・治療効果を保証するものではありません。掲載されている数値はすべて当院での実績に基づく統計値です。治療に関するご判断は、必ず医師との診察・相談のうえで行ってください。

ドクターミナガワ渋谷整形

院長 皆川 浩

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-15 カーサ渋谷2F / 03-3462-2266 / <https://2266.co.jp/>